



REQUERIMIENTOS TERMICOS E HIDRICOS DEL CULTIVO	FASES FENOLOGICAS DEL CULTIVO DE PAPA AMARGA (ALTIPLANO BOLIVIANO)					
	Emergencia	Formación brotes laterales	Botón Floral	Floración	Fin de Floración	Maduración
Temperatura óptima	4° a 8° C	Temperaturas nocturnas 3° a 4° C	Temperaturas nocturnas 3° a 4° C	Temperaturas nocturnas 3° a 4° C	4° a 8° C	4° a 8° C
Temperatura base	2° C	2° C	2° C	2° C	2° C	2° C
Temperatura crítica	Menor a -1° C	Menor a -1° C	Menor a 0° C	Menor a 0° C	Menor a 0° C	Menor a -1° C
Temperatura letal	-7° C	-4° C	-2° C	-1° C	-2° C	-7° C
Precipitación efectiva (PE)	10mm	30mm	20mm	20mm	20mm	20mm
	No soporta déficit	No soporta déficit	No soporta déficit	No soporta déficit	Soporta déficit	No soporta déficit
Kc	Kc inicial 0.35	Kc medio 1.10				Kc final 0.60
Periodo Vegetativo	15 a 25 días	35 a 45 días	50 a 60 días			15 a 20 días
Cultivo en desarrollo siembra temprana	1 al 25 septiembre	28 de septiembre a 09 noviembre	10 noviembre al 7 de enero			8 a 27 días
Cultivo en desarrollo siembra normal	1 al 25 Octubre	28 de Octubre a 09 Diciembre	10 diciembre al 7 de Febrero			8 a 27 días
Cultivo en desarrollo siembra tardía	1 al 25 noviembre	28 de diciembre a 09 enero	10 enero al 7 de marzo			8 a 27 días